

Énoncés QCM

► N° 72***PRESCRIPTION ET SURVEILLANCE
DES PSYCHOTROPES***

- 1.** Parmi ces propositions, lesquelles peuvent correspondre à des effets indésirables des neuroleptiques classiques ?
 - a. Syndrome extrapyramidal
 - b. Syndrome métabolique
 - c. Constipation
 - d. Allongement du QT
 - e. Leucopénie

- 2.** Quelles sont les précautions indispensables à prendre avant l'introduction d'un traitement par Clozapine (Léponex*) ?
 - a. NFS
 - b. TSHus
 - c. Imagerie cérébrale
 - d. ECG
 - e. Examen clinique

► N° 61***TROUBLE SCHIZOPHRÉNIQUE DE L'ADOLESCENT
ET DE L'ADULTE***

- 3.** Parmi ces propositions, la(les)quelle(s) caractérise(nt) la schizophrénie ?
 - a. Le syndrome dissociatif
 - b. Le syndrome délirant paranoïaque
 - c. Le syndrome délirant paranoïde
 - d. Les passages à l'acte hétéro-agressifs
 - e. La catatonie

► **N° 72**

***PRESCRIPTION ET SURVEILLANCE
DES PSYCHOTROPES***

- 4.** Parmi ces anomalies électro cardiographiques, la(les)quelle(s) peut(vent) être attribuée(s) aux neuroleptiques ?
- Allongement du QT
 - Sus-décalage ST
 - Bloc auriculo-ventriculaire paroxystique
 - Torsade de pointe
 - PR court

► **N° 69**

***TROUBLES DES CONDUITES ALIMENTAIRES
CHEZ L'ADOLESCENT ET L'ADULTE***

- 5.** Parmi ces signes, le(s)quel(s) est(sont) typiquement retrouvé(s) dans un trouble des conduites alimentaires de type anorexie mentale ?
- Aménorrhée
 - Amaigrissement
 - Vomissements
 - Dysmorphophobie
 - Crises de boulimie

► **N° 72**

***PRESCRIPTION ET SURVEILLANCE
DES PSYCHOTROPES***

6. Quels sont les effets des benzodiazépines ?

- a. Anxiolytique
- b. Myorelaxant
- c. Anticonvulsivant
- d. Amnésiant
- e. Hypnotique

► **N° 64**

***DIAGNOSTIQUER : UN TROUBLE DÉPRESSIF,
UN TROUBLE ANXIEUX GÉNÉRALISÉ,
UN TROUBLE PANIQUE, UN TROUBLE
PHOBIQUE, UN TROUBLE OBSESSIONNEL
COMPULSIF, UN ÉTAT DE STRESS
POST-TRAUMATIQUE, UN TROUBLE
DE L'ADAPTATION (DE L'ENFANT
À LA PERSONNE ÂGÉE), UN TROUBLE
DE LA PERSONNALITÉ.***

7. Parmi ces familles la ou laquelle(s) peut(vent) être choisie(s) en première intention pour le traitement d'un épisode dépressif majeur d'intensité sévère ?

- a. Inhibiteur de la recapture de la sérotonine (IRS)
- b. Inhibiteur de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline (IRSNA)
- c. Inhibiteur de la monoamine oxydase (IMAO)
- d. Tricyclique (ou imipraminique)
- e. Lamotrigine

► N° 61***TROUBLE SCHIZOPHRÉNIQUE DE L'ADOLESCENT
ET DE L'ADULTE***

- 8.** La prévalence de la schizophrénie en population générale est de :
- a. 0,01 %
 - b. 0,1 %
 - c. 1 %
 - d. 0,5 %
 - e. 4 %
- 9.** Parmi ces examens lesquels ne sont pas indispensables au bilan préalable à l'instauration d'un traitement spécifique de la schizophrénie ?
- a. NFS
 - b. Électro-encéphalogramme (EEG)
 - c. ECG
 - d. Bilan neuropsychologique
 - e. Test de grossesse chez la femme
- 10.** Parmi ces situations ou données cliniques pouvant être retrouvées chez un schizophrène, lesquelles indiquent une hospitalisation ?
- a. Idées suicidaires avec potentiel suicidaire élevé
 - b. Hétéro-agressivité ou trouble du comportement hétéro agressif
 - c. Déstabilisation en l'absence d'entourage, de famille ou de soutien
 - d. Consommation festive de cannabis
 - e. Hallucinations auditives persistantes repérées par le patient

► **N° 60**

DÉCRIRE L'ORGANISATION DE L'OFFRE DE SOINS EN PSYCHIATRIE, DE L'ENFANT À LA PERSONNE ÂGÉE

- 11.** Parmi ces structures, la ou laquelle(s) sont en mesure de recevoir en consultation des patients adultes présentant des troubles mentaux :
- Centre médico-psychologique (CMP)
 - Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP)
 - Établissement et service d'aide par le travail (ESAT)
 - Maison départementale des personnes handicapées (MDPH)

► **N° 61**

TROUBLE SCHIZOPHRÉNIQUE DE L'ADOLESCENT ET DE L'ADULTE

- 12.** Une schizophrénie de type paranoïde est essentiellement caractérisée par :
- Une catalepsie ou une stupeur catatonique
 - Un négativisme extrême
 - Un délire paranoïaque
 - Une ou des idées délirantes et/ou des hallucinations
 - Une thymie basse
- 13.** Une schizophrénie de type hébéphrénique ou désorganisée est essentiellement caractérisée par :
- Un délire paranoïde
 - Des hallucinations psycho-sensorielles
 - Un discours désorganisé
 - Un comportement désorganisé
 - Des affects inappropriés

► **N° 72**

***PRESCRIPTION ET SURVEILLANCE
DES PSYCHOTROPES***

- 14.** Dans le cas d'un épisode dépressif majeur d'intensité légère la(es) quelles de ces propositions thérapeutiques vous paraît(ssent) valide(s) ?
- Une cure d'électroconvulsivothérapie (ECT)
 - La prescription de benzodiazépine en première intention
 - Une prise en charge psychothérapique
 - La prescription d'un antidépresseur parce que cette classe a montré une efficacité supérieure aux autres stratégies, dans cette situation particulière
 - Une hospitalisation en psychiatrie ou en soins généraux

► **N° 70**

TROUBLES SOMATOFORMES À TOUS LES ÂGES

- 15.** Un diagnostic de trouble somatisation (ou somatomorphe ou somatoforme) ne peut être posé qu'en l'absence d'origine somatique étayée par des examens médicaux. Parmi ces manifestations cliniques, lesquelles peuvent s'inscrire dans un tel trouble ?
- Des signes sexuels (désintérêt sexuel, troubles de l'érection ou de l'éjaculation...)
 - Des signes pseudo-neurologiques (signes évoquant une affection neurologique sans origine somatique retrouvée : dysphonie, trouble de l'équilibre, paralysie ou faiblesse musculaire localisée...)
 - Des signes thyroïdiens (goitre, exophtalmie, myxœdème...)
 - Des symptômes gastro-intestinaux (nausées, ballonnements...)
 - Une prise de poids

16. Parmi ces propositions, la(les)quelle(s) caractérise(nt) l'hypochondrie ?

- a. Il existe des signes physiques que le sujet interprète de manière erronée et qui conduisent à une crainte d'être atteint d'une maladie grave
- b. La crainte d'être atteint d'une maladie grave est strictement idéique et ne s'associe à aucun signe physique
- c. L'intensité du trouble peut donner un tableau délirant
- d. Un bilan clinique et paraclinique aux résultats normaux suffit généralement à faire disparaître les symptômes psychiques

► **N° 61**

***TROUBLE SCHIZOPHRÉNIQUE DE L'ADOLESCENT
ET DE L'ADULTE***

17. Le(s)quel(s) de ces signes caractérise(nt) une schizophrénie catatonique ?

- a. Un négativisme extrême
- b. Une immobilité motrice avec catalepsie
- c. Un délire paranoïde
- d. Un syndrome d'automatisme mental
- e. Une tristesse de l'humeur